

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -2-4-68 767734

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE L'ILE DE FRANCE

(SEINE, SEINE & OISE, SEINE & MARNE, EURE)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 47 Av. Paul-Doumer, (93) MONTREUIL-S-BOIS - 287 76-71

C. C. P. PARIS 9063-96

ABONNEMENT ANNUEL

25 F

26 MARS 1968

BULLETIN n° 90
Supplément n° 1

AVERTISSEMENTS

TAVELURE DU POIRIER.

CULTURES FRUITIÈRES

Les conditions climatiques de ces derniers jours ont favorisé l'évolution des périthèces et de la végétation. Les périthèces arrivent à maturité, les variétés de poiriers ont atteint le stade C 3 ou sont proches de ce stade. Dans la mesure où un traitement n'a pas été effectué récemment contre les conidies provenant des chancres de rameaux, traiter dès réception du présent bulletin toutes les variétés ayant atteint ou dépassé le stade C 3. Sur les variétés moins hâtives, intervenir dès l'apparition de ce stade. Pour ce premier traitement, accorder la préférence aux produits cupriques.

TAVELURE DU POMMIER.

La maturité des périthèces est légèrement plus en retard que celle des périthèces de Tavelure du poirier ; seuls les pommiers hâtifs ont atteint le stade C 3. Mais la végétation des pommiers et la maturation des périthèces vont évoluer rapidement à la faveur du temps doux et humide. Un traitement pourra intervenir dès la fin du mois sur les variétés les plus hâtives. Sur les autres variétés, intervenir dès l'apparition du stade C 3-D.

INFORMATIONS

D I V E R S

- ANTHONOME DU POMMIER : Les températures sont favorables à la reprise de son activité. Les pommiers sont sensibles dès le stade B. Un traitement ne se justifie que dans les vergers où des dégâts ont été commis l'année dernière.
- CECIDOMYIE DES POIRETTES : Les premières sorties se sont produites récemment en élevage. La ponte n'a lieu qu'à partir du stade p 3, toute intervention est donc inutile avant l'apparition de ce stade. Dans les vergers où des attaques ont eu lieu en 1967, se tenir prêt à traiter. Utiliser un des produits conseillés contre l'Anthonome du pommier.
- PUCERONS - PSYLLES - ACARIENS - CHENILLES : Les premières éclosions de Puceron noir du pêcher ont été observées en situations favorables. Sont à redouter également, éclosions de Puceron vert du pommier, pontes et éclosions de Psylles, sorties des Chenilles hivernantes du Bombyx chrysorrhée (cul brun), apparition des femelles hivernantes de l'Araignée jaune (*Tetranychus telarius*).
- MONILIA DE L'ABRICOTIER : Deux nouveaux traitements sont nécessaires : avant ouverture de la fleur, dès l'apparition des pétales blancs et à la chute des collerettes.
- OIDIUM DU POMMIER : Supprimer les pousses oïdiées. Effectuer des traitements soignés et répétés dès le départ de la végétation.

L'Ingénieur et l'Agent Technique
chargés des Avertissements Agricoles,

H. SIMON et R. MERLING.

L'Inspecteur
de la Protection des Végétaux,

G. BERGER.

Imprimerie de la Station de l'Ile-de-France - Directeur-Gérant : L. Bouyx.
47, Avenue Paul Doumer - 93- MONTREUIL-Ss-BOIS.

P 145